

Внимание!

В приложении № 3 к журналу «Кардиоваскулярная терапия и профилактика» № 6 за 2007 год в российских рекомендациях III пересмотра «Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза» на странице 7 в таблице 6 допущена техническая опечатка. Таблица должна быть такой:

Таблица 6

Уровни ХС ЛНП (ммоль/л), при которых следует начинать терапию и целевые уровни ХС ЛНП у больных в зависимости от категории риска *

Категория	Уровень ХС ЛНП для начала немедикаментозной терапии	Уровень ХС ЛНП для начала применения лекарств	Целевой ХС ЛНП, ммоль/л
Очень высокий риск	>2,0	>2,0	≤2,0
Высокий риск	> 2,5	> 2,5	≤2,5
Умеренный риск	> 3,0	> 3,5	≤ 3,0
Низкий риск	> 3,5	>4,0	≤ 3,0

Примечание: * - если в течение 3 месяцев у пациентов с умеренным и низким риском мероприятия по изменению образа жизни: коррекция веса, прекращение курения, повышение ФА, диета с ограничением насыщенных жиров, недостаточны для достижения целевого уровня ХС ЛНП, необходимо назначать медикаментозную терапию. У больных с диагностированной ИБС и ее эквивалентами, у пациентов без клинических проявлений ССЗ, у которых 10-летний риск смерти от ССЗ по шкале SCORE ≥5% наряду с немедикаментозными средствами следует одновременно начать медикаментозную терапию.