

Опечатка

В приложении № 2 к журналу «Кардиоваскулярная терапия и профилактика» № 6 за 2007 года в российских рекомендациях «Диагностика и лечение метаболического синдрома» на странице 11 в таблице 3 допущена опечатка.

Таблица 3 должна быть такой:

Таблица 3

Критерии диагностики СД и других видов гипергликемии (ВОЗ, 1999)

	КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЛЮКОЗЫ (ммоль/л)		
	Цельная кровь		Плазма
	Венозная	Капиллярная	Венозная
		НОРМА	
Натощак	3,3–5,5	3,3–5,5	4,0–6,1
через 2 ч после ТТГ	<6,7	<7,8	<7,8
		СД	
Натощак	≥6,1	≥6,1	≥7,0
или через 2 часа после ТТГ или через 2 часа	≥10,0	≥11,1	≥11,1
после приема пищи (постприандиальная гликемия)			
или случайное определение гликемии в любое время дня вне зависимости от времени приема пищи	≥11,1	≥11,1	
		НТГ	
Натощак (если определяется)	<6,1	<6,1	<7,0
Через 2 часа после ТТГ	6,7–10,0	7,8–11,1	7,8–11,1
		НАРУШЕННАЯ ГЛИКЕМИЯ НАТОЩАК	
Натощак	≥5,6	≥5,6	≥6,1
	<6,1	<6,1	<7,0
Через 2 часа (если определяется)	<6,7	<7,8	<7,8