

Уважаемые читатели,

возраст пациентов, сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания и хроническая некардиальная патология имеют важное прогностическое значение у больных с COVID-19 (COroNa VIrus Disease 2019) во время госпитализации. Исходы на этапе длительного постгоспитального наблюдения пациентов после перенесенного COVID-19 требуют дальнейшего изучения.

Первичная вакцинация и ревакцинации от COVID-19 позволяют сформировать комплексный иммунитет в ближайшем и средне-отдаленном периоде. Применение вакцин различных типов при последующей ревакцинации может способствовать формированию более устойчивого комплексного иммунитета.

Авторы *Драпкина О. М., Чащин М. Г., Бернс С. А., Горшков А. Ю., Жданова О. В., Рыжакова Л. Н., Литинская О. А.* проанализировали гуморальный и клеточный иммунные ответы при использовании гетерологичных и гомологичных схем ревакцинации против вируса SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2).

Лукьянов М. М. и соавт. в рамках регистра ТАРГЕТ-ВИП изучили исходы за двухлетний период наблюдения больных после госпитального лечения по поводу COVID-19. Смертность за 2 года наблюдения составила 5,9%, более $>1/3$ летальных исходов в первые 3 мес. Вакцинация против SARS-CoV-2 двукратно снижала риск повторных случаев COVID-19.

Для оценки генетической предрасположенности человека к определенному признаку или заболеванию используют шкалы генетического риска (ШГР). Большинство ШГР объясняют лишь небольшую часть вариабельности признака. Впервые в России *Киселевой А. В. и соавт.* проведена валидация 14 ШГР сахарного диабета 2 типа, разработанных на популяциях европейского происхождения.

Иванова А. А. и соавт. исследовали маркеры хронической сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса левого желудочка (ХСНсФВ) у пациентов с одышкой неуточненной этиологии. Выявление простых клинико-морфологических критериев ХСНсФВ способствует повышению настороженности специалистов в отношении этой патологии.

Приятного чтения,
Главный редактор,
д.м.н., профессор, академик РАН
Драпкина Оксана Михайловна



О проблемах, связанных с лекарственными препаратами (ПСЛ) — "Drug related problems", в отечественной литературе пишут очень мало. *Марцевич С. Ю.* в своей статье "Проблемы, связанные с лекарственными препаратами. Классификация. Способы предупреждения" приводит подробную классификацию ПСЛ, выделяет ПСЛ, связанные с действием врача, и ПСЛ, связанные с организацией работы медицинского персонала, упоминает собственные исследования, описывающие различные виды ПСЛ.

Интероцепция — это восприятие и интеграция центральной нервной системой афферентной информации о состоянии организма. Исследование interoцепции имеет важное практическое значение, поскольку известно об ее изменении при целом ряде заболеваний. *Миненко И. А. и соавт.* провели сравнение методов субъективной оценки interoцепции сердца, сопоставили результаты трех вариантов теста для оценки interoцепции сердца на одной и той же выборке здоровых добровольцев, обсудили применение тестов в клинической практике.