

Уважаемые читатели,

своевременная и эффективная первичная медико-санитарная помощь может снизить риск госпитализации при заболеваниях/состояниях, чувствительных к амбулаторному лечению (СЧАЛ). В различных странах номенклатура СЧАЛ характеризуется значительной вариативностью, обусловленной демографическими, эпидемиологическими и организационными особенностями. В систематическом обзоре *Шепеля Р. Н. и др.* установлено, что в Российской Федерации номенклатура СЧАЛ еще не определена. Полученные данные могут послужить основой для разработки научного проекта по формированию отечественной номенклатуры, что предоставит дополнительные возможности в оценке эффективности мероприятий на уровне первичной медико-санитарной помощи.

В систематическом обзоре *Степиной Е. В. и др.* представлены результаты сравнения "портрета" пациента с фибрилляцией предсердий (ФП) в отечественных исследованиях с пациентами трех крупных рандомизированных клинических исследований, посвященных применению прямых оральных антикоагулянтов. Выявлено, что российский больной с ФП имеет большое количество сопутствующих патологий и более тяжелое течение ФП, чем пациенты, участвовавшие в вышеуказанных международных исследованиях.

Коллективом авторов в рамках исследования ЭССЕ-РФ представлены результаты 6-летнего проспективного наблюдения взрослой популяции и рассмотрена связь между привычками питания и риском смерти от всех причин (ОС). Исследователями отмечено, что избыточное потребление соли, привычка досаливания пищи и ежедневное включение в рацион солений увеличивают риск ОС в общей популяции Российской Федерации и среди мужчин. Регулярное присутствие в рационе красного мяса, жидких форм молочных продуктов и сыра ассоциировано со снижением риска ОС у российских женщин.

В настоящее время для оценки эндотелиальной дисфункции (ЭД) применяется достаточно узкий спектр лабораторных показателей, при этом значение многих из них остается недостаточно изучен-



ным. *Тимофеев Ю. С. и др.* провели систематизацию литературных данных, посвященных исследованию биохимических маркеров ЭД, начиная с общепринятых, таких как метаболиты оксида азота и эндотелин 1-21, и заканчивая менее изученными биохимическими и молекулярными маркерами. В статье описаны ассоциированные с ЭД показатели, которые могут рассматриваться в качестве потенциальных биомаркеров риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Баллонная ангиопластика и стентирование гемодинамически значимого поражения коронарных артерий являются золотым стандартом лечения ишемической болезни сердца. Первый опыт имплантации биорезорбируемого стента нового поколения молодому пациенту представлен *Васильевым Д. К. и др.* Использование биорезорбируемых стентов позволяет нивелировать ряд недостатков металлических стентов и может стать эффективной и безопасной альтернативой стандартной методике лечения стенозирующих поражений коронарных артерий.

Приятного чтения,
Главный редактор,
д.м.н., профессор, академик РАН
Драпкина Оксана Михайловна