

Уважаемые читатели,

"интероцепция" описывается как способность центральной нервной системы воспринимать информацию о состоянии организма. Работа *Сукмановой А. А. и соавт.* является первым исследованием интероцепции сердца у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) в возрасте от 22 до 50 лет. Полученные данные позволяют предположить, что у пациентов с АГ среднего возраста повышение интероцепции, связанное с высоким уровнем артериального давления, компенсируется формированием интероцептивного дефицита, на который не влияют дополнительные психологические и физиологические факторы.

Изменения микроциркуляторного русла являются одним из основных механизмов развития АГ. Данные фотоплетизмографии, полученные *Королевым А. И. и соавт.*, демонстрируют повышенный тонус гладкомышечных клеток терминальных мышечных артерий и распределительных артериол у мужчин с изолированной диастолической АГ. Это исследование свидетельствует о повышении общего периферического сосудистого сопротивления в качестве механизма развития изолированной диастолической АГ.

Сравнительный анализ сывороточного уровня галанина у больных ишемической болезнью сердца с наличием и отсутствием сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса и у лиц без сердечно-сосудистых заболеваний проведен *Тимофеевым Ю. С. и соавт.* Полученные результаты позволяют предположить наличие связи уровня галанина с патофизиологическими механизмами развития ишемической болезни сердца, независимо от наличия хронической сердечной недостаточности.

Два исследования посвящены проблеме ожирения. *Елиашевич С. О. и соавт.* определяют эффективность групповой когнитивно-поведенческой терапии ожирения в сочетании с диетологической коррекцией у женщин. *Рогожкина Е. А. и соавт.* представляют результаты рандомизированного исследования, посвященного снижению массы тела у пациентов с ожирением на фоне низкочастотной чрескожной стимуляции блуждающего нерва.

Приятного чтения,
Главный редактор,
д.м.н., профессор, академик РАН
Драпкина Оксана Михайловна



Группой исследователей ЭССЕ-РФ и ЭССЕ-РФ2 опубликованы данные по психоэмоциональному стрессу у лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями. Еще одной *группой исследователей* проведена оценка реализации вторичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний на амбулаторном уровне здравоохранения в странах Содружества Независимых Государств.

Интересным для практикующих врачей будет представленный *Советом экспертов алгоритм скрининга додементных когнитивных нарушений* у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на приеме у терапевта.

Обзорные статьи в этом номере посвящены роли циркулирующих микроРНК в развитии коллатерального кровообращения при хронической окклюзии коронарной артерии (*Киселева А. В. и соавт.*) и роли желчных кислот в атерогенезе (*Сафарян А. С.*).