Уважаемые читатели,

изучение биохимического профиля сыворотки крови пациентов с декомпенсированной сердечной недостаточностью (СН) с сохраненной фракцией выброса в зависимости от наличия ожирения открывает новые возможности для использования комплекса кардиомаркеров (в т.ч. белков теплового шока) и биомаркеров ремоделирования межклеточного матрикса в диагностике и прогнозировании лечения. *Тимофеев Ю. С. и соавт.* указывают на вовлеченность ожирения в патогенез хронической СН и патофизиологические процессы, происходящие при декомпенсации СН.

Продолжается публикация результатов исследований, проведенных в рамках исследования российской популяции ЭССЕ-РФ3: *Гарбузовой Е. В. и соавт.* представлено изучение ассоциации интервала QTc с уровнем С-реактивного белка у жителей г. Новосибирска независимо от кардиометаболических факторов риска и ишемической болезни сердца.

Приобретенные пороки клапанов сердца являются причиной увеличения глобальной сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. В статье *Мамедова М. Н. и соавт.* рассматриваются наиболее часто встречающиеся типы клапанного поражения сердца среди взрослых, вопросы эпидемиологии, особенности патогенеза и современные взгляды на их коррекцию.

Клинический случай, представленный *Васильевым Д. К. и соавт.* демонстрирует успешное эндоваскулярное лечение многососудистого поражения коронарного русла под контролем внутрисосудистого определения показателей коронарного кровотока у коморбидной пациентки, ранее перенесшей транскатетерную имплантацию аортального клапана.

Приятного чтения,
Главный редактор,
д.м.н., профессор, академик РАН
Драпкина Оксана Михайловна